




REVISTA BRASILEIRA DE LEPROLOGIA

ÍNDICE GERAL

VOLUME 32 — 1964

ALMEIDA, J. O. — Serological behaviour of lepromatous sera in relation to complement fixation tests for syphilis, Chagas' disease and brucellosis.....	15
BEIGUELMAN, B. & QUAGLIATO, R. — Sobre a reação de Mitsuda	39
BELDA, W. — Um caso de leprofobia tratado pela hipnose.....	35
Belda, W. — <i>vide também</i> REGINATO, L. E. & BELDA, W.....	49
CAMPOS, N. S. & LOBO, O. P. — Considerações em torno da sensibilização tuberculínica entre os doentes de lepra do tipo lepromatoso	23
IN MEMORIAN — NESTOR SOLANO PEREIRA.....	1
Lobo, O. P. — <i>vide</i> CAMPOS, N. S. & LOBO, O. P.....	23
MARTINS, M. G., Filho — Nossos ensaios com a inclusão de silicônio líquido em doentes de lepra, no Instituto Educacional "Padre Bento Dias Pacheco" (Nota Prévia).....	47
NECROLÓGIO — KENSUKE MITSUDA.....	64
PUPO, J. A. — Comentários à margem do VIII Congresso Internacional de Leprologia (Rio de Janeiro, 1963).....	3
Quagliato, R. — <i>vide</i> BEIGUELMAN, B. & QUAGLIATO, R.....	39
REGINATO, L. E. & BELDA, W. — Ensaio de correção das deformidades amiotróficas do dorso da mão por novos métodos: retalhos dermogordurosos, enxertos de fascia lata e inclusões de silicone.....	49
SOCIEDADE PAULISTA DE LEPROLOGIA (Atas).....	54



Omcilon-A "M"

Rei entre os medicamentos tópicos

CREME — para lesões úmidas, exsudativas. Tubos de 5 g. Cada g contém 1 mg (0,1%) de acetônio-triamcinolona, 2,5 mg de neomicina base (como sulfato), 0,25 mg de gramicidina e 100.000 unidades de nistatina.

POMADA — para lesões secas, escamosas. Tubos de 5 g. Cada g contém 1 mg (0,1%) de acetônio-triamcinolona, 2,5 mg de neomicina base (como sulfato), 0,25 mg de gramicidina e 100.000 unidades de nistatina.



SQUIBB

*Um século
de experiência
inspira
confiança*