

REVISTA BRASILEIRA DE LEPROLOGIA

2.ª *SERIE DA*
REVISTA DE LEPROLOGIA
DE SÃO PAULO



Direção Científica

Prof. J. AGUIAR PUPO
Prof. da Universidade de São Paulo

Redatores:

NELSON SOUZA CAMPOS
Diretor do Departamento de Profilaxia
da lepra

LAURO DE SOUSA LIMA
Diretor do Sanatório Padre Bento

Comissão de Redação

L. M. BECHELLI — H. CERRUTI — R. PACHECO BRAGA

SÃO PAULO — BRASIL

Instituto Paulista de Dermoterapia Ltda.

Diretor: Prof. DR. LINEU PRESTES

Prof. Catedrático de Química Toxicológica e Bromatológica da Universidade de S. Paulo. Ex-chefe do Serviço Químico do Departamento de Profilaxia da Lepra.

NO TRATAMENTO DA LEFRA:

CHAULMOETHYL

Esteres etílicos do óleo de chaulmoogra
creosotados a 4%

Chaulmoethyl = Iodico

Esteres etílicos do óleo de chaulmoogra
iodados a 0,5%

CHAULMOBENZIL

Esteres etilbenzílicos dos ácidos gordurosos do óleo
de chaulmoogra.

— Preparados com matéria prima das melhores procedências e com a mais moderna e perfeita técnica.

Embalagens: *Clinica:*

Em caixas de 6 ampolas, 1.º, 2.º e 3.º graus
correspondendo a 1-2 e 3 cc.

Em caixas de 50 ampolas de 1.º, 2.º e 3.º graus.

Hospitalar:

Em caixas de 100 ampolas de 1, 2 e 3 cc.

Em caixas de 50 ampolas de 5, 10 e 20 cc.

Nota: Toda caixa traz no seu verso o poder rotatório específico do ester contido nas ampolas.

Laboratorio e Escritorio:

RUA SANTO ANTONIO N.º 225
Fone 2-3829 - Caixa Postal, 3437 — São Paulo, Brasil

Jedomagnesiol

COMPOSIÇÃO

THIOSULFATO DE MAGNESIO
CLORETO DE CALCIO

•

Síndromes de excitação psico-motora,
espasmofilia, alergia, anafilaxia,
síndromes ansiosos

•

Amostras e literatura:

LABORATORIO PHARMA

Marcello Massara & Cia.

Rua Tabatinguera, 164 - Fone, 3-7579

SÃO PAULO

QUANDO UM TÓPICO É INDICADO...

Tópico não irritante para as mucosas e que alia os poderes anestésicos, adstringentes e antissépticos da Stovaine, resorcina e fucsina à ação bacteriostática do 149 RB, novo derivado hidrossolúvel da Thiazamida, a LOCOTHIAZAMIDA realiza uma quimioterapia local completa, intensa e profunda

ANGINAS SOB TÓDAS AS FORMAS CLÍNICAS
ESTOMATITES — GENGIVITES
ULCERAÇÕES DERMATOLÓGICAS
FERIDAS TRAUMÁTICAS
VAGINITES E ULCERAÇÕES DO
APARÉLHO GENITAL FEMININO

Vidro de 40 cm² de solução a 22,65 % de 149 RB, correspondente a 10% de Thiazamida-base.



LOCOTHIAZAMIDA
 149 RB • STOVAINE • RESORCINA • FUCSINA

★ CORRESPONDÊNCIA: RHODIA - CAIXA POSTAL 95-B - SÃO PAULO ★