
Anexos

8. ANEXOS

Anexo 1 – Análise quantitativa de linfócitos T (CD4+ e CD8+). Número total de linfócitos T/mm² distribuídos na derme superficial (DS), média (DM), profunda (DP) e total, e proporção CD4:CD8 nas lesões cutâneas de pacientes com hanseníase hanseníase-dimorfa tuberculóide reacional antes do tratamento (DTR).

Biópsia	CD4		CD4		CD4		CD8		CD8		CD4:CD8	
	DS	DM	DP	TOTAL	DS	DM	DP	TOTAL	DS	DM	DP	TOTAL
B02-0861	405	420	395	1220	293	215	233	742				1,64
B02-1338	388	423	510	1322	383	368	443	1195				1,11
B02-2354	657	465	365	1487	368	317	285	970				1,53
B02-2441	487	437	490	1413	357	320	255	932				1,52
S03-0440	577	542	800	1918	278	405	375	1058				1,81
B03-0544	313	192	168	672	283	187	175	645				1,04
B03-0561	392	500	467	1358	328	333	490	1152				1,18
B03-0578	405	525	595	1525	395	502	532	1428				1,07
B03-3471	278	168	250	697	472	223	343	1038				0,67
B04-0347	423	342	522	1287	297	247	415	958				1,34

Anexo 2 – Análise quantitativa de linfócitos T (CD4+ e CD8+). Número total de linfócitos T/mm2 distribuídos na derme superficial (DS), média (DM), profunda (DP) e total, e proporção CD4:CD8 nas lesões cutâneas de pacientes com hanseníase hanseníase-dimorfa em reação reversa (D-RR).

Biópsia	CD4		CD4		CD4		CD8		CD8		CD4:CD8
	DS	DM	DP	TOTAL	DS	DM	DP	TOTAL			
B00-2524	370	480	238	1088	287	423	185	895	1,22		
B04-2826	403	487	353	1243	328	288	193	809	1,54		
B01-3223	280	370	432	1082	222	292	375	889	1,22		
B01-1189	292	342	445	1079	150	225	300	675	1,60		
B00-1966	380	403	372	1155	305	248	287	840	1,38		
B02-2415	320	213	347	880	192	163	245	600	1,47		
B01-0580	455	510	478	1443	282	373	363	1018	1,42		
B00-4127	395	402	335	1132	418	282	223	923	1,23		
B02-1022	330	272	292	894	240	212	203	655	1,36		
B03-4012	355	362	337	1054	185	222	215	622	1,69		

Anexo 3 — Análise semiquantitativa de linfócitos B (CD20+ e CD79+). Distribuição dos linfócitos CD20+ e CD79+ na derme superficial (DS), média (DM), profunda (DP) e total em lesões cutâneas de pacientes com hanseníase dimorfa-tuberculóide reacional antes do tratamento (DTR). Valores expressos em + (Escala de 0-4+).

Biópsia	CD20	CD20	CD20	CD20	CD79	CD79	CD79	CD79
	DS	DM	DP	TOTAL	DS	DM	DP	TOTAL
B02-0861	2	3	4	3	2	3	4	3
B02-1338	3	3	3	3	2	3	3	3
B02-2354	3	3	4	3	3	3	4	3
B02-2441	2	3	3	3	2	3	3	3
S03-0440	2	3	3	3	2	3	3	3
B03-544	2	2	3	2	1	1	2	1
B03-0561	2	3	3	3	1	2	2	2
B03-0578	2	3	3	3	1	2	2	2
B03-3471	1	1	3	2	1	1	3	2
B04-0347	1	2	3	2	1	2	2	2

Anexo 4 – Análise semiquantitativa de linfócitos B (CD20+ e CD79+). Distribuição dos Linfócitos CD20+ e CD79+ na derme superficial (DS), média (DM), profunda (DP) e total em lesões cutâneas de pacientes em hanseníase dimorfa em reação reversa (D-RR). Valores expressos em +(Escala de 0-4+)

Biópsia	CD20	CD20	CD20	CD20	CD79	CD79	CD79	CD79
	DS	DM	DP	TOTAL	DS	DM	DP	TOTAL
B00-2524	3	3	2	3	3	3	2	3
B04-2826	2	2	2	2	2	2	2	2
B01-3223	2	2	2	2	2	2	2	2
B01-1189	2	2	2	2	2	2	2	2
B00-1966	2	2	3	2	2	2	2	2
B02-2415	2	3	3	3	2	3	3	3
B01-0580	2	2	2	2	2	2	2	2
B00-4127	2	3	3	3	2	3	3	3
B02-1022	2	3	3	3	2	3	3	3
B03-4012	2	3	2	2	2	3	2	2

Anexo 5 - Análise quantitativa de células NK (CD57+). Número total de células NK/mm² distribuídas na derme superficial (DS), média (DM), profunda (DP) e total nas lesões cutâneas de pacientes com hanseníase dimorfa-tuberculóide reacional antes do tratamento (DTR).

Biópsia	NK DS	NK DM	NK DP	NK TOTAL
B02-0861	7	11	6	24
B02-1338	20	25	28	73
B02-2354	20	37	22	79
B02-2441	39	18	29	86
S03-0440	47	41	34	122
B03-0544	37	34	24	95
B03-0561	99	77	138	314
B03-0578	38	52	57	147
B03-3471	9	6	5	20
B04-0347	155	112	110	377

Anexo 6 — Análise quantitativa de células NK (CD57+). Número total de células NK/mm² distribuídas na derme superficial (DS), média (DM), profunda (DP) e total nas lesões cutâneas de pacientes com hanseníase dimorfa em reação reversa (D-RR).

Biópsia	NK DS	NK DM	NK DP	NK TOTAL
B00-2524	515	525	213	1253
B04-2826	25	10	18	53
B01-3223	60	60	125	245
B01-1189	75	120	100	295
B00-1966	100	155	85	340
B02-2415	21	15	17	53
B01-0580	35	80	55	170
B00-4127	110	105	105	320
B02-1022	45	45	55	145
B03-4012	55	30	31	116

Anexo 7 — Análise quantitativa de células expressando IL-10. Número total de células IL10+/mm² distribuídas na derme superficial (DS), média (DM), profunda (DP) e total nas lesões cutâneas de pacientes com hanseníase dimorfa-tuberculóide reacional antes do tratamento (DTR).

Biópsia	IL-10 DS	IL-10 DM	IL-10 DP	IL-10 TOTAL
B02-0861	49	42	16	107
B02-1338	7	9	7	23
B02-2354	52	26	41	119
B02-2441	30	34	17	81
S03-0440	5	5	5	15
B03-0544	26	11	5	42
B03-0561	2	7	7	16
B03-0578	63	75	30	168
B03-3471	19	13	16	48
B04-0347	31	10	05	46

Anexo 8 — Análise quantitativa de células expressando IL-10. Número total de células IL10+/mm2 distribuídas na derme superficial (DS), média (DM), profunda (DP) e total nas lesões cutâneas de pacientes com hanseníase dimorfa em reação reversa (D-RR).

Biópsia	IL-10 DS	IL-10 DM	IL-10 DP	IL-10 TOTAL
B00-2524	22	28	19	69
B04-2826	34	15	12	61
B01-3223	50	38	18	106
B01-1189	17	10	6	33
B00-1966	30	24	5	59
B02-2415	20	16	7	43
B01-0580	20	24	3	47
B00-4127	43	23	15	81
B02-1022	42	28	16	86
B03-4012	-	-	-	-

Anexo 9 — Análise semiquantitativa de células expressando INOS. Imunomarcção positiva de células inflamatórias nas biópsias de lesões cutâneas de pacientes com hanseníase dimorfa-tuberculóide reacional antes do tratamento (DTR). Valores expressos em + (Escala de 0-3+)

Biópsia	INOS DS	INOS DM	INOS DP	INOS TOTAL
B02-0861	2	1	1	1
B02-1338	2	2	2	2
B02-2354	1	1	1	1
B02-2441	1	1	1	1
S03-0440	3	3	3	3
B03-0544	2	2	2	2
B03-0561	1	1	1	1
B03-0578	2	2	2	2
B03-3471	-	-	-	-
B04-0347	-	-	-	-

Anexo -10 Análise semiquantitativa de células expressando iNOS. Imunomarcção positiva de células inflamatórias nas biópsias de lesões cutâneas de pacientes com hanseníase dimorfa em reação reversa (D-RR). Valores expressos em + (Escala de 0-3+)

Biópsia	INOS DS	INOS DM	INOS DP	INOS TOTAL
B00-2524	3	3	3	3
B04-2826	3	3	3	3
B01-3223	2	2	1	2
B01-1189	2	2	2	2
B00-1966	2	2	1	2
B02-2415	3	2	2	2
B01-0580	2	2	1	2
B00-4127	3	2	2	2
B02-1022	2	2	2	2
B03-4012	3	3	2	3